

لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة ومجانية للأطفال من سن 5 وأكبر

سيمحي لقاح كوفيد-19 من فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا من الأمراض الخطيرة ويعيدهم إلى العيش بأمان مع أسرهم وأصدقائهم.

لم تكن هناك مخاوف تتعلق بالسلامة أو آثار جانبية خطيرة لوحظت في التجارب السريرية. بدأت التجارب السريرية في مارس 2021. ضمت المرحلة الأولى من التجربة في البداية 4500 طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و11 عامًا في أكثر من 90 موقعًا للتجارب السريرية حول العالم.




شارك أكثر من 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا في التجارب. هذا مشابه للعدد المتضمن في العديد من التجارب السريرية المماثلة مع الأطفال. شملت التجارب متطوعين من أعراق وأعراق مختلفة، بما في ذلك المتطوعون من ذوي الأصول الأسبانية / اللاتينيين (77% بيض، 6% سود، 8% آسيويين، 17% من أصل إسباني / لاتيني، 7% متعدد الأعراق).



يتم إعطاء الأطفال جرعتين من لقاح فايزر. كل جرعة تساوي ثلث المقدار المعطى للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر.



اللقاح فعال. أنتج استجابات مناعية مماثلة لدى الأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا كما في الأطفال الأكبر سنًا والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا.



تقوم إدارة الغذاء والدواء (FDA) بمراجعة التجارب لتحديد ما إذا كانت اللقاحات آمنة. توجد لجنة علمية مستقلة تراقب العمل. اللقاحات مصرح بها وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باستخدامها.



الآثار الجانبية المؤقتة للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا مماثلة للأطفال الأكبر سنًا والبالغين. قد يعاني طفلك من ألم مؤقت في الذراع والصداع والتعب أو الألم لمدة يوم أو نحو ذلك. التهاب عضلة القلب، أو التهاب عضلة القلب، هو عرض جانبي نادر للغاية مع حالات خفيفة في الغالب. عادة ما يتعافى الناس من تلقاء أنفسهم أو يحتاجون إلى الحد الأدنى من العلاج. لم تُشاهد حالات التهاب عضلة القلب خلال التجارب السريرية، وستستمر المراقبة المستمرة.

