

# 어린이용 COVID-19 백신의 부작용 및 예상해야 할 사항



백신은 디프테리아, 홍역, 및 수두와 같은 여러 가지 소아 질환을 크게 감소시켰습니다.

소아마비와 같은 일부 질병의 경우, 미국에서는 효과적인 백신으로 인해 퇴치되었습니다.

백신의 부작용 대부분은 통상 경증이며 오래 가지 않습니다.

위중한 백신 반응은 극히 드물며, COVID-19 임상 시험에서 위중한 부작용은 특별히 언급된 바가 없었습니다.

생후 6개월 이상 어린이들의 일시적 부작용은 나이가 더 많은 어린이 및 성인의 경우와 유사합니다.

자녀는 하루 가량 일시적으로 팔이 아프거나, 두통 및 피로감 또는 몸살 기운을 느낄 수도 있습니다.

심근염 즉 심장 근육의 염증은 극히 희귀한 백신 부작용이며, COVID-19에 감염된 환자들에게서 더 일반적으로 나타납니다.

백신 접종 후 경증 사례들은 주로 청소년 및 젊은 성인층에서 보고되었으며, 보통은 자력으로 회복하거나 최소한의 치료만 필요할 뿐입니다. 3-11세 연령층의 어린이를 대상으로 한 임상 시험 중에 심근염의 사례는 일절 보이지 않았습니다.

**COVID-19 백신은 위중한 질병으로부터 자녀를 지켜 드립니다.**

위중한 부작용의 위험성은 COVID-19 바이러스가 원인인 위중한 질병의 위험성보다 훨씬 더 낮습니다.



**자녀의 COVID-19 백신 접종은 어디서 가능합니까?**

소아과 의사 및 진료소와 같이 자녀가 보통 진료를 받는 곳이면 어디서든 시작하십시오. COVID-19 백신의 경우, 약국에서도 3-11세용 백신을 보유하고 있습니다.

[MySpot.nc.gov](https://www.myspot.nc.gov)를 방문, 가까운 접종 장소를 찾으십시오.



**자녀는 학교에 가지 않고 집에 머물러야 하겠습니까?**

자녀들이 각각 다르겠지만, 아프거나 피곤해 할 가능성은 있습니다. 가능하다면, 자녀가 하루 정도 쉴 시간 여유가 있을 때 백신 접종을 고려해 보십시오.



**백신 접종은 팔이나 다리에 받게 됩니까?**

자녀의 나이에 따라, 팔이나 허벅지를 권장합니다.